

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 2019

### ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ВИЧ

---

\* 24,5 [21,6–25,5] млн людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии (по состоянию на конец июня 2019 г.)

Общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 37,9 [32,7–44,0] млн человек (2018 г.)

Число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,7 [1,4–2,3] млн. (2018 г.)

Число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 770 000 [570 000–1,1 млн] человек. (2018 г.)

74,9 [58,3–98,1] млн человек заразились ВИЧ с начала эпидемии. (2018 г.)

32,0 [23,6–43,8] млн человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней с начала эпидемии. (2018 г.)

---

### Люди, живущие с ВИЧ

- В 2018 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 37,9 [32,7–44,0] млн человек:
  - 36,2 [31,3–42,0] млн взрослых
  - 1,7 [1,3–2,2] млн детей (в возрасте до 15 лет)
- В 2018 г. 79% [67–92%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
- Около 8,1 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ.

### Люди, живущие с ВИЧ и получающие лечение в рамках антиретровирусной терапии

- По состоянию на конец июня 2019 года 24,5 [21,6–25,5] млн людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.
- В 2018 году доступ к антиретровирусной терапии имели 23,3 миллиона [20,5–24,3 миллиона] человек, живущих с ВИЧ, по сравнению с 7,7 миллиона [6,8–8,0 миллиона] в 2010 году.
- 62% [47–74%] всех людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2018 году.
  - 62% [47–75%] взрослых в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, и 54% [37–73%] детей в возрасте 0–14 лет имели доступ к лечению.
  - 68% [52–82%] взрослых женщин в возрасте 15 лет и старше имели доступ к лечению, в то время как только 55% [41–68%] взрослых мужчин в возрасте 15 лет и старше имели доступ.

- В 2018 году 82% [62– >95%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду.

### **Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией**

- Число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 40% по сравнению с 1997 годом, когда этот показатель достиг пикового значения.
  - В 2018 году число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,7 [1,4–2,3] млн по сравнению с 2,9 [2,3–3,8] млн в 1997 году.
- В 2018 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, по оценкам, снизился на 16% относительно 2010 года, с 2,1 [1,6–2,7] млн до 1,7 [1,4–2,3] млн.
  - В 2018 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 41% относительно 2010 года, с 280 000 [190 000–430 000] до 160 000 [110 000–260 000].

### **Смертность вследствие СПИДа**

- Число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, снизилось на 56% относительно пикового показателя 2004 года.
  - В 2018 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 770 000 [570 000–1,1 млн] человек. Для сравнения в 2004 году этот показатель составлял 1,7 [1,3–2,4] млн человек и 1,2 [860 000– 1,6] млн человек в 2010 году.
- Смертность вследствие СПИДа снизилась на 33% с 2010 года.

### **90–90–90**

- В 2018 году 79% [67%– 92%] людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
- 78% [69%– 82%] людей, знающих свой статус, имели доступ к лечению.
- Супрессия вирусной нагрузки наблюдалась у 86% [72%– 92%]) людей, пользующихся доступом к лечению.
- В 2018 году из всех людей, живущих с ВИЧ, 79% [67–92%] знали свой статус, 62% [47–74%] имели доступ к лечению и 53% [43–63%] достигли супрессии вирусной нагрузки.

### **Женщины**

- Каждую неделю ВИЧ заражаются около 6000 молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет.
  - В Африке к югу от Сахары четыре из пяти новых случаев инфицирования среди подростков в возрасте 15–19 лет отмечаются у девушек. Вероятность наличия ВИЧ у молодых женщин в возрасте 15–24 лет в два раза выше, чем у мужчин.
- Более одной трети (35%) женщин по всему миру подвергались физическому и/или сексуальному насилию в некоторые периоды своей жизни.

- В некоторых регионах вероятность заражения ВИЧ в полтора раза выше у женщин, подвергавшихся физическому или сексуальному насилию со стороны своего партнера, чем у женщин, в отношении которых такого насилия не совершалось.

### **Ключевые группы риска**

- На ключевые группы риска и их сексуальных партнеров приходится:
  - 54% новых случаев заражения ВИЧ по всему миру.
  - Более 95% новых случаев заражения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.
  - 95% новых случаев заражения ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
  - 88% новых случаев заражения ВИЧ в Западной и Центральной Европе, а также в Северной Америке.
  - 78% новых случаев заражения ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  - 65% новых случаев заражения ВИЧ в Латинской Америке.
  - 64% новых случаев заражения ВИЧ в Западной и Центральной Африке.
  - 47% новых случаев заражения ВИЧ в странах Карибского бассейна.
  - 25% новых случаев заражения ВИЧ в Восточной и Южной Африке.
- Риск заражения ВИЧ:
  - в 22 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами;
  - в 22 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков;
  - в 21 раз выше среди лиц, работающих в секс-индустрии;
  - в 12 раз выше среди трансгендерных лиц.

### **ВИЧ/Туберкулез**

- Туберкулез является основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, на него приходится около одной трети случаев смерти, связанных со СПИДом.
- В 2017 году приблизительно у 10 миллионов [9,0—11,1 миллиона] человек развился туберкулез, примерно 9% из них жили с ВИЧ.
  - Люди, живущие с ВИЧ, не имеющие симптомов туберкулеза, нуждаются в профилактической терапии заболевания. Это уменьшает риск развития туберкулеза и сокращает смертность от туберкулеза/ВИЧ примерно на 40%.
- По оценочным данным 49% людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом, не знают о своей коинфекции и поэтому не получают лечения.

### **Инвестиции**

- По состоянию на конец 2018 года было выделено 19,0 млрд долл. США на борьбу со СПИДом в странах с низким и средним уровнями дохода, почти на 1 млрд меньше, чем в 2017 году.
  - Около 56% от общих ресурсов, выделенных на борьбу с ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода в 2018 году, было получено из внутренних источников.
- По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом потребуется 26,2 млрд долл. США.

## Глобальные данные по ВИЧ

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2018/*2019
<b>Люди, живущие с ВИЧ</b>	<b>24.9 млн</b> [21.5 млн– 28.9 млн]	<b>28.5 млн</b> [24.5 млн– 33.0 млн]	<b>31.7 млн</b> [27.3 млн– 36.8 млн]	<b>33.2 млн</b> [28.7 млн– 38.6 млн]	<b>34.8 млн</b> [30.0 млн– 40.4 млн]	<b>35.6 млн</b> [30.7 млн– 41.3 млн]	<b>36.4 млн</b> [31.4 млн– 42.3 млн]	<b>37.2 млн</b> [32.1 млн– 43.2 млн]	<b>37.9 млн</b> [32.7 млн– 44.0 млн]
<b>Новые случаи заражения ВИЧ (всего)</b>	<b>2.8 млн</b> [2.2млн– 3.6 млн]	<b>2.4 млн</b> [1.9 млн– 3.2 млн]	<b>2.1 млн</b> [1.6 млн– 2.7 млн]	<b>2.0 млн</b> [1.5 млн– 2.6 млн]	<b>1.9 млн</b> [1.5 млн– 2.5 млн]	<b>1.9 млн</b> [1.5 млн– 2.4 млн]	<b>1.8 млн</b> [1.4 млн– 2.4 млн]	<b>1.8 млн</b> [1.4 млн– 2.3 млн]	<b>1.7 млн</b> [1.4 млн– 2.3 млн]
<b>Новые случаи заражения ВИЧ (в возрасте 15+)</b>	<b>2.3 млн</b> [1.8 млн– 3.1 млн]	<b>2.0 млн</b> [1.6 млн– 2.6 млн]	<b>1.8 млн</b> [1.4 млн– 2.4 млн]	<b>1.8 млн</b> [1.4 млн– 2.3 млн]	<b>1.7 млн</b> [1.3 млн– 2.2 млн]	<b>1.7 млн</b> [1.3 млн– 2.2 млн]	<b>1.7 млн</b> [1.3 млн– 2.2 млн]	<b>1.6 млн</b> [1.3 млн– 2.1 млн]	<b>1.6 млн</b> [1.2 млн– 2.1 млн]
<b>Новые случаи заражения ВИЧ (в возрасте 0–14)</b>	<b>450 000</b> [300 000– 700 000]	<b>410 000</b> [270 000– 640 000]	<b>280 000</b> [190 000– 430 000]	<b>230 000</b> [150 000– 350 000]	<b>200 000</b> [130 000– 310 000]	<b>190 000</b> [120 000– 290 000]	<b>180 000</b> [120 000– 280 000]	<b>170 000</b> [110 000– 270 000]	<b>160 000</b> [110 000– 260 000]
<b>Смертность вследствие СПИДа</b>	<b>1.4 млн</b> [1.0 млн– 1.9 млн]	<b>1.7 млн</b> [1.3 млн– 2.3 млн]	<b>1.2 млн</b> [860 000– 1.6 млн]	<b>1.0 млн</b> [770 000– 1.4 млн]	<b>920 000</b> [680 000– 1.3 млн]	<b>880 000</b> [650 000– 1.2 млн]	<b>840 000</b> [620 000– 1.1 млн]	<b>800 000</b> [600 000– 1.1 млн]	<b>770 000</b> [570 000– 1.1 млн]
<b>Люди, получающие антиретровирусную терапию</b>	<b>576 000</b> [507 000– 599 000]	<b>2.0 млн</b> [1.8 млн– 2.1 млн]	<b>7.7 млн</b> [6.8 млн– 8.0 млн]	<b>11.2 млн</b> [9.9 млн– 11.7 млн]	<b>15.1 млн</b> [13.3 млн– 15.7 млн]	<b>17.0 млн</b> [15.0 млн– 17.7 млн]	<b>19.1 млн</b> [16.8 млн– 19.9 млн]	<b>21.3 млн</b> [18.8 млн– 22.2 млн]	<b>*24.5 млн</b> (на июнь 2019) / <b>23.3 млн</b> [20.5 млн– 24.3 млн]
<b>Ресурсы, выделенные на борьбу с ВИЧ (в странах с низким и средним уровнями дохода)**</b>	<b>4.8</b> млрд долл. США***	<b>9.4</b> млрд долл. США***	<b>15.0</b> млрд долл. США***	<b>17.4</b> млрд долл. США***	<b>18.1</b> млрд долл. США****	<b>18.0</b> млрд долл. США****	<b>18.4</b> млрд долл. США****	<b>19.9</b> млрд долл. США****	<b>19.0</b> млрд долл. США****

\* По состоянию на конец июня 2019 года 24,5 [21,6–25,5] млн людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.

\*\* Постоянных долларов 2016 года.

\*\*\* Страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2012 года.

\*\*\*\* Страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2013 года.

## Региональные данные за 2018 г.

Регион	Люди, живущие с ВИЧ 2018 г.	Новые случаи заражения ВИЧ, 2018 г.			Смертность вследствие СПИДа 2018 г.	Люди, получающие антиретровирусную терапию 2018 г.
		Total	Aged 15+	Aged 0–14		
Страны Восточной и Южной Африки	<b>20.6 млн</b> [18.2 млн–23.2 млн]	<b>800 000</b> [620 000–1.0 млн]	<b>710 000</b> [550 000–940 000]	<b>84 000</b> [57 000–140 000]	<b>310 000</b> [230 000–400 000]	<b>13.8 млн</b> [12.1 млн–14.3 млн]
Азиатско-Тихоокеанский регион	<b>5.9 млн</b> [5.1 млн–7.1 млн]	<b>310 000</b> [270 000–380 000]	<b>300 000</b> [260 000–360 000]	<b>12 000</b> [9800–18 000]	<b>200 000</b> [160 000–290 000]	<b>3.2 млн</b> [2.8 млн–3.3 млн]
Западная и Центральная Африка	<b>5.0 млн</b> [4.0 млн–6.3 млн]	<b>280 000</b> [180 000–420 000]	<b>220 000</b> [140 000–340 000]	<b>58 000</b> [36 000–87 000]	<b>160 000</b> [110 000–230 000]	<b>2.6 млн</b> [2.2 млн–2.7 млн]
Латинская Америка	<b>1.9 млн</b> [1.6 млн–2.4 млн]	<b>100 000</b> [79 000–130 000]	<b>100 000</b> [77 000–130 000]	<b>3100</b> [2100–4600]	<b>35 000</b> [25 000–46 000]	<b>1.2 млн</b> [1.1 млн–1.3 млн]
Карибский бассейн	<b>340 000</b> [290 000–390 000]	<b>16 000</b> [11 000–24 000]	<b>15 000</b> [10 000–22 000]	<b>1100</b> [660–1500]	<b>6700</b> [5100–9100]	<b>187 000</b> [164 000–194 000]
Ближний Восток и Северная Африка	<b>240 000</b> [160 000–390 000]	<b>20 000</b> [8500–40 000]	<b>18 000</b> [7700–37 000]	<b>1500</b> [710–2 800]	<b>8400</b> [4800–14 000]	<b>78 800</b> [69 400–82 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	<b>1.7 млн</b> [1.5 млн–1.9 млн]	<b>150 000</b> [140 000–160 000]	<b>150 000</b> [130 000–160 000]	—*	<b>38 000</b> [28 000–48 000]	<b>648 000</b> [571 000–674 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	<b>2.2 млн</b> [1.9 млн–2.4 млн]	<b>68 000</b> [58 000–77 000]	<b>68 000</b> [58 000–77 000]	—*	<b>13 000</b> [9400–16 000]	<b>1.7 млн</b> [1.5 млн–1.8 млн]
Общемировые показатели	<b>37.9 млн</b> [32.7 млн–44.0 млн]	<b>1.7 млн</b> [1.4 млн–2.3 млн]	1.6 млн [1.2 млн–2.1 млн]	160 000 [110 000–260 000]	770 000 [570 000–1.1 млн]	<b>23.3 млн</b> [20.5 млн–24.3 млн]

\* Оценочные данные о детях не публикуются из-за их небольшого числа.

## Региональная антиретровирусная терапия в 2018 году

### Контактная информация

	Процент беременных женщин, получающих антиретровирусные препараты для предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку	Процент взрослых (старше 15 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	Процент детей (в возрасте 0—14 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	Процент всех людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию (всего)
Страны Восточной и Южной Африки	92% [69—95%]	67% [52—78%]	62% [42—82%]	67% [52—78%]
Азиатско-Тихоокеанский регион	56% [47—71%]	54% [41—68%]	78% [57—95%]	54% [41—68%]
Западная и Центральная Африка	59% [42—78%]	53% [37—69%]	28% [18—39%]	51% [36—66%]
Латинская Америка	76% [61—95%]	63% [44—79%]	48% [34—64%]	62% [44—78%]
Карибский бассейн	86% [68—95%]	56% [42—68%]	42% [29—51%]	55% [42—67%]
Ближний Восток и Северная Африка	28% [16—47%]	32% [18—54%]	35% [21—53%]	32% [18—54%]
Восточная Европа и Центральная Азия	—*	37% [30—43%]	—*	38% [30—44%]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	—*	79% [61—92%]	—*	79% [61—92%]
По всему миру	82% [62—95%]	62% [47—75%]	54% [37—73%]	62% [47—74%]

\* Оценочные данные о детях не публикуются из-за их небольшого числа.

Отдел по глобальной информации и коммуникациям | +41 22 791 1697 | [communications@unaid.org](mailto:communications@unaid.org)

Дополнительная информация доступна по адресу: [aidsinfo.unaid.org](http://aidsinfo.unaid.org)